

المرشد العلاجي في تشخيص وتديير
ومتابعة التهاب الحويضة والكلية الحاد

اعداد العقيد الطبيب اكرم عيسى


التهاب الحويضة والكلية

- الاعراض :الم خاصرة ،غثيان ،اقياء،حرارة < ٣٨ ،الم الزاوية الضلعية الفقرية.
- يستطب فحص البول للبحث عن بيلة قيحية وبيلة دموية
- زرع البول بيدي < ١٠٠٠٠٠٠ مستعمرة/مل .
- يجب اجراء ايكو جهاز بولي لنفي الانسداد البولي .
- الاستقصاءات الاخرى مثل الطبقي المحوري بدون حقن او الصورة الظليلة او الرينو غرام تجرى حسب الحالة السريرية اذا استمر المريض مصاب بترفع حروري بعد ٢٢ ساعة من العلاج لنفي عوامل مختلطة مثل الحصيات


- وخراج كلية او حول الكلية .
- الاجراء الروتيني للصورة الظليلية عند البالغين المصابين بالتهاب الحويضة والكلية غير المختلط يملك قيمة ضعيفة لان معظم هؤلاء المرضى لديهم جهاز بولي علوي طبيعي.

العلاج

Figure 2.1. Clinical management of acute pyelonephritis



الشكل ٢،١ التدبير السريري لالتهاب الحويضة و الكلية الحاد
أعراض و علامات التهاب الحويضة و الكلية
(حمى ، ألم خاصرة ، بييلة قيحية ، $WBC \uparrow$)



- المتابعة بعد العلاج:
- لا يستطب زرع البول الروتينى بعد العلاج لدى المرضى غير العرضيين
- يعتبر فحص البول العادي كافي .
- لدى السيدات اللواتي لا تتحسن اعراض الالتهاب لديهن خلال ٣ ايام او التي تتحسن ثم تعود خلال اسبوعين يجب اعادة زرع البول والتحسس مع اجراء الايكو والطبقي المحوري .
- اما عند المرضى بدون تشوهات بولية يجب الافتراض بان الجرثوم المسبب للمرض غير حساس للصاد المستخدم في البدء وهنا يجب اعادة العلاج باستخدام صاد حيوي اخر .
- وبالنسبة للمرضى الذين ينكسون بنفس العامل الممرض يعتبر العلاج لمدة ستة اسابيع شافيا.

جدول ٢،٤ العلاج الفموي لالتهاب الحويضة و الكلية الحاد غير المختلط لدى السيدات غير الحوامل ما قبل سن اليأس حسب مستوى الشاهد و درجة التوصية

الدواء	الجرعة	المدة	ملاحظات
سيبروفلوكساسين	٥٠٠ مغ × ٢	٧ أيام	يعتبر أكثر فعالية من السفترياكسون و الباكتريم و أقل تأثيرات جانبية
سيفيدوكسيم	٢٠٠ مغ × ٢	١٠ أيام	سريراً مشابه للسبروفلوكساسين ٥٠٠ مغ × ٢
غاتيفلوكساسين	٤٠٠ مغ × ١	١٠ أيام	مشابه للسبروفلوكساسين ٥٠٠ مغ × ٢
ليفوفلوكساسين	٢٥٠ مغ × ١	١٠ أيام	مشابه للسبروفلوكساسين ٥٠٠ مغ × ٢
لوميفلوكساسين	٤٠٠ مغ × ١	١٠ أيام	الدراسات الإحصائية غير مستكملة
TMP-SMX	١٨٠/٨٠٠ × ٢	١٤ يوم	يعطى فقط إذا كانت الجراثيم حساسة للتريميتوبريم